

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ ПОЛОГІВ

Цикл хірургічних дисциплін

Науковий керівник: В. С. Дрегалюк

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
м. Кременець, Україна

Важливими факторами зменшення пологового болю є підготовка до пологів і підтримка роділлі медичним персоналом. Особливого значення у благоприємному перебігу пологів відіграє підтримка жінки партнером.

Мета дослідження. Порівняти перебіг та розвиток ускладнень при партнерських та традиційних пологах.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз історій пологів та анкет 20 жінок, котрі народжували на базі пологового відділення Бережанської ЦРКЛ. Обстежуваних жінок поділили на 2 групи. До I групи ввійшли 10 пацієнток, які отримували партнерську підтримку, а до II групи 10 пацієнток із традиційною методикою ведення пологів. У групі із партнерською підтримкою роділлі могли використовувати м'ячі, вільно вибирати положення тіла в I і II періоді, партнери проводили немедикаментозні методи знеболення (масаж). У групі із традиційним веденням пологи вели на ліжку Рахманова у положенні на спині.

Перебіг пологів та післяпологового періоду оцінювали на основі суб'єктивних відчуттів – прояву больового синдрому (за 10-бальною шкалою) та даних об'єктивного обстеження – пологові травми, об'єм крововтрати в пологах, використання пологопідсилення.

Середнє значення вираженості болю в I та II періоді становив 4,4 в I групі та 5,2 балів в II групі, середнє значення болю в післяпологовому періоді - 1,8 та 3,1 балів відповідно. Пологові травми виникли у 3 (30 %) пацієнток I групи та 6 (60 %) – II групи, пологове підсилення проводили в 1 (10 %) пацієнтки I групи та 3 (30 %) – II групи. При цьому середнє значення пологової крововтрати становило 155 мл в I групі та 280 мл – в II групі.

Висновок. У групі жінок із партнерською підтримкою відмічено нижчий рівень больових відчуттів під час пологів та в післяпологовому періоді, рідше виникали пологові травми, також спостерігався менший об'єм крововтрати.