



Дистрес плода. Асфіксія новонародженого

1. Народився плід вагою 2800,0, довжиною 50 см, крик гучний, шкіра рожева. Які ознаки характерні для доношеного плода?

- A. Зріст 50 см
- B. Тім'ячка на голові дитини закриті
- C. Шкіра вкрита пушком
- D. Шкіра білого забарвлення
- E. Маса тіла 2000г

2. Діагноз асфіксії новонароджених середнього ступеня може бути встановленим, якщо оцінка новонародженого за шкалою Апгар становить:

- A. 5 - 6 балів.
- B. 9 - 10 балів.
- C. 0 балів.
- D. 1 - 2 бали.
- E. 2 - 3 бали

3. Вагітна, 41-42 тиж вагітності, була направлена у пологовий зі скаргами на послаблення рухів плода. Яка найбільш доцільна тактика розродження пацієнтки?

- A. Проведення окситоцинового тесту
- B. Збудження пологової діяльності окситоцином
- C. Збудження пологової діяльності
- D. Очікування початку самостійної пологової діяльності
- E. Кесарів розтин.

4. Вагітність 38-39 тижнів. Головне передлежання, перша позиція, передній вид. Проведено дослідження біофізичного профілю плода, встановлено за 30 хв спостереження дихальних рухів-2, рухів плода -4, кінцівки зігнуті, розгинання 2 рази, не стресовий тест 5 акселерацій, вертикальний розмір вільної ділянки вод - 1. Яка оцінка БПП:

- A. 5 балів
- B. 2 бали
- C. 7 балів
- D. 3 бали
- E. 9 балів

5. У новонародженого зовнішній масаж серця проводять:

- A. однією рукою
- B. тільки масажером
- C. двома пальцями
- D. немає значення
- E. двома руками

6. Вкажіть як оцінюється стан новонароджених:

- A. за шкалою Вітлінгера
- B. за шкалою Апгар
- C. шляхом зважування
- D. перебігом пологів
- E. шляхом антропометрії

7. Абсолютні показання для екстреного проведення ШВЛ у новонародженого:

- A. оцінка за шкалою Апгар 8 балів
- B. оцінка за шкалою Апгар 2 бали
- C. оцінка за шкалою Апгар у перші хвилини 4-6 балів, через 5 хв. 8-10 балів
- D. частота серцебиття немовляти 100 уд. за 1 хв.
- E. акроціаноз у немовляти

8. В жіночу консультацію прийшла вагітна, яка знаходиться на обліку з приводу даної вагітності. Вагітність протікає без ускладнень, стан плода задовільний, термін вагітності 28 тижнів. Яке рутинне обстеження запропонує акушерка вагітній для моніторингу стану плода?

- A. Кардіотокографія
- B. УЗД плода
- C. Тест рухів плода
- D. Доплерографія судин пуповини
- E. Екскреція естрадіолу

9. Акушерка проводить аускультацию плода. Яка частота серцебиття плода при задовільному стані під час пологів?
- A. 100-180/хв
 - B. 120-130/хв
 - C. 120-140/хв
 - D. 110-170/хв
 - E. 140-160/хв
10. Які показники реєструє кардіотокографія:
- A. Серцева діяльність плода і скоротлива активність матки
 - B. Серцева діяльність плода і рухова активність плода
 - C. Скоротлива активність матки і рухова активність плода
 - D. Все перераховане
 - E. Нічого з перерахованого
11. Акушерка ФАПу веде передчасні пологи, народилась недоношена дитина. Вкажіть який показник не входить до шкали Сільвермана при оцінці її стану.
- A. Колір шкіри
 - B. Рух грудної клітки
 - C. Характер дихання
 - D. Утягнення грудини
 - E. Утягнення міжребрових проміжків
12. У роділлі 40 років під час II періоду пологів виникла слабкість потуг. Голівка плода майже на тазовому дні, стріловидний шов у прямому розмірі виходу з таза. Серцебиття плода 180/хв. Назвіть операцію, яку необхідно здійснити для прискорення пологів.
- A. Накладання акушерських щипців
 - B. Краніотомія
 - C. Екстракція плода за ніжку
 - D. Накладання шкірно-головних щипців за Уілт-Івановим-Гаусом
 - E. Кесарів розтин

13. Вагітна скаржиться на задишку, різке збільшення живота. Термін вагітності 29-30 тижнів. Обвід живота - 120 см. Висота стояння дна матки - 38 см. Матка напружена. Частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода приглушене до 140/хв. Про яке ускладнення йде мова?

- A. багатоводдя
- B. багатопліддя
- C. бронхіальна астма
- D. дистрес плода
- E. прееклампсія

14. Після народження дитини на першій хвилині життя серцебиття менше 100, дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлекси слабкі, тонус м'язів знижений. Визначте, для якого стану характерні такі проблеми?

- A. Гемолітична хвороба новонародженого
- B. Асфіксія новонародженого
- C. Колапс
- D. Внутрішньочерепна пологова травма
- E. Кефалогематома

15. Доношена дитина народилася із дворазовим обвиттям шиї пуповиною. У немовляти виражена блідість шкірних покривів, відсутні дихання і рефлекси, серцебиття 60 уд/хв. Поставте діагноз:

- A. Вроджена вада серця
- B. Асфіксія середнього ступеня
- C. Асфіксія тяжкого ступеня
- D. Асфіксія легкого ступеня
- E. Травма голови

16. Акушерка проводить огляд вагітної. Який метод обстеження дасть інформацію про стан внутрішньоутробного плода?

- A. Аускультация серцебиття плода
- B. Вимірювання обводу живота
- C. Вимірювання тазу
- D. Опитування пацієнтки
- E. Пальпація частин плода

17. Акушерка пологового залу оцінює новонародженого після народження. Який з показників не входить в шкалу Апгар?

- A. Частота дихання
- B. М'язовий тонус
- C. Колір слизових оболонок
- D. Частота серцевих скорочень
- E. Рефлекси

18. Ви працюєте в пологовому залі. Народилася дитина з помірною асфіксією. Провідними ознаками асфіксії при оцінці за шкалою Апгар є:

- A. ступінь жовтяниці шкіри
- B. частота дихальних рухів
- C. ступінь жовтяниці склер
- D. частота сечовипускань за добу
- E. частота стільця на добу

19. Акушерка пологового відділення проводить реанімацію новонародженого. Які клінічні ознаки необхідно оцінити?

- A. дихання, частоту серцевих скорочень, колір шкіри
- B. оцінка за шкалою Апгар
- C. рефлекси, тонус, колір шкіри
- D. дихання, рефлекси, колір шкіри
- E. оцінка за шкалою Сильвермана

20. Акушерка ЖК проводить вагітної кардіокографію. Що визначають цим методом?

- A. Серцеві скорочення плода і рухи плода
- B. Серцеві скорочення плода
- C. Маткові скорочення і рухи плода
- D. Серцеві скорочення плода і маткові скорочення
- E. Маткові скорочення

21. Ви працюєте у пологовій залі. Народилася дитина с помірною асфіксією. Провідною ознакою асфіксії за оцінкою по шкалі Апгар є:

- A. Ступінь жовтушності шкіри
- B. Ступінь жовтяничності склер
- C. Частота випорожнень за добу
- D. Частота сечовипуску за добу
- E. Частота дихальних рухів

22. Оцініть стан доношеного новонародженого за шкалою Апгар, якщо серцебиття 120/хв., ясне, ритмічне, крик голосний, рухи активні, шкірні покриви рожеві, при введенні катетера в глотку кашляє.

- A. 9 балів
- B. 10 балів
- C. 7 балів
- D. 8 балів
- E. 6 балів

Дистрес плода. Асфіксія новонародженого. Відповіді:

- | | | |
|---------|----------|----------|
| 1) - A; | 9) - D; | 17) - C; |
| 2) - A; | 10) - A; | 18) - B; |
| 3) - E; | 11) - A; | 19) - A; |
| 4) - E; | 12) - A; | 20) - D; |
| 5) - C; | 13) - A; | 21) - E; |
| 6) - B; | 14) - B; | 22) - B. |
| 7) - D; | 15) - C; | |
| 8) - C; | 16) - A; | |