



Плід – об'єкт пологів

1. При народженні дитини на 40 тижні вагітності проводиться комплекс заходів I туалет новонародженого. Оцінка за шкалою Апгар 1 хв. - 9 балів, 5 хв. - 10 балів. Визначте черговість проведення зважування новонародженої дитини:

- A. Після контакту "шкіра-до-шкіри"
- B. Перед контактом "шкіра-до-шкіри"
- C. Через 5 хвилин після народження
- D. Через 2 години після народження
- E. Відразу після народження

2. Акушерка у новонародженої дівчинки виявила крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Що з дитиною?

- A. Пухирчатка новонародженого
- B. Внутрішньочерепна пологова травма
- C. Водянка мозку
- D. Пологова пухлина
- E. Кефалогематома

3. Народився плід вагою - 2800,0 г; довжиною - 50 см, крик гучний, шкіра рожева. Які ознаки характерні для доношеного плоду?

- A. Шкіра білого забарвлення
- B. Маса тіла 2000 г
- C. Тім'ячка на голові дитини закриті
- D. Зріст 50 см
- E. Шкіра вкрита пушком

4. Оцінити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо серцебиття плоду 120/хв., дихання глибоке, рефлекси жваві, м'язовий тонус добрий, шкіра рожева:

- A. 10 балів
- B. 1-2 бали
- C. 8-9 балів
- D. 6 балів
- E. 12 балів

5. Де у плода знаходиться чиста артеріальна кров:

- A. У вені пуповини
- B. У стегновій артерії
- C. У черевному відділі аорти
- D. У легенях плода
- E. У печінковій вені

6. В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною вагітністю: положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ - 100 см, ВСДМ - 35 см. Визначте передбачувану масу плода по формулі Лебєдєва:

- A. 4000 г
- B. 2800 г
- C. 4500 г
- D. 2500 г
- E. 3500 г

7. Коли доцільно прикласти новонародженого до грудей після фізіологічних пологів?

- A. Через 12 годин після пологів
- B. У перші 2 години після пологів
- C. Одразу після початку лактації
- D. Одразу після пологів
- E. У першу добу після пологів

8. Фетопатія - це?

- A. Внутрішньоутробне ураження сформованих органів і систем плода
- B. Спонтанні мутації статевих клітин
- C. Захворювання, що виникає у перші 3 місяці вагітності
- D. Водянка голови
- E. Дія хімічних речовин

9. Надмірно довгою вважають пуповину довжиною:

- A. понад 60 см
- B. 30 - 40 см
- C. Понад 80 см
- D. 40 - 50 см
- E. 50 - 60 см

10. На передлеглій голівці пальпується сполучнотканинна пластинка трикутної форми, де сходиться три шва. Яке тім'ячко пальпується:
- A. Бокове заднє тім'ячко
 - B. Мале тім'ячко
 - C. Велике тім'ячко
 - D. Бокове переднє тім'ячко
 - E. Мале переднє тім'ячко
11. Які судини проходять у пуповині:
- A. 2 вени 1 арт.
 - B. 2 арт. 1 вена
 - C. 2 арт. 2 вени
 - D. 3 вени 1 арт.
 - E. 1 арт. 4 вени
12. В якому випадку найбільш ймовірний розвиток гемолітичної хвороби у новонародженого:
- A. Мати Rh+ чоловіка Rh+
 - B. Мати Rh- плід Rh+
 - C. Мати Rh+ плід Rh+
 - D. Мати Rh+ плід Rh-
 - E. Мати Rh- чоловіка Rh-
13. Визначили, що відстань від волосистої частини лоба до підпотиличної ямки становить 10,5 см. Який це розмір голівки і чому дорівнює обвід голівки за цим розміром?
- A. вертикальний розмір, обвід - 33 см
 - B. великий косий розмір, обвід - 40 см
 - C. малий косий розмір, обвід - 32 см.
 - D. прямий розмір, обвід - 34 см
 - E. середній косий розмір, обвід - 33 см.
14. Акушерка приймає пологи в передньому виді потиличного передлежання. Яким розміром прорізується голівка плода в даному випадку і чому дорівнює обвід голівки за цим розміром?
- A. прямий розмір - 12 см., обвід - 34 см
 - B. вертикальний розмір - 9,5 см., обвід - 33 см

- C. малий косий розмір - 9,5 см., обвід - 32 см.
- D. середній косий розмір - 10,5 см., обвід - 33 см.
- E. великий косий розмір - 13,5 см, обвід - 36-40 см

15. Роділля 25 років в терміні вагітності 39-40 тижнів звернулась до пологового будинку з потужною діяльністю. При дослідженні встановлено, що голівка прорізується відстанню між підпотиличною ямкою та переднім кутом великого тім'ячка. Яким розміром народиться голівка плода?

- A. Відвіслим
- B. Прямим
- C. Середнім косим
- D. Малим косим
- E. Великим косим

16. Першовагітна 19 років в терміні 39-40 тижнів, перейми регулярні на протязі 8 годин, відкриття шийки матки до 8 см, голівка середнім косим розміром в косому розмірі широкою частиною тазу. Вказати орієнтири розміру, яким народиться голівка плода

- A. підборіддя та велике тім'ячко
- B. підборіддя та потиличний горб
- C. підпотилична ямка та межа волосистої частини голови
- D. підпотилична ямка та велике тім'ячко
- E. перенісся та потиличний горб

17. Молода подружня пара, яка планує народження дитини цікавиться першим критичним періодом під час вагітності. На який день проходить імплантація зародка в порожнину матки?

- A. 7-8
- B. 8-9
- C. 10-11
- D. 11-12
- E. 9-10

18. Молода подружня пара, яка планує народження дитини, цікавиться в якому терміні вагітності необхідно стати на облік в жіночу консультацію. Дайте правильну пораду.
- A. Одразу після останньої менструації
 - B. Після першого відчуття руху плода
 - C. У 12-14 тижнів
 - D. У 12 тижнів
 - E. До 12 тижнів
19. Народилась доношена дитина. Акушерка проводить антропометрію. Чому дорівнює малий косий розмір голівки?
- A. 12 см
 - B. 11 см
 - C. 9,5 см
 - D. 10 см
 - E. 13 см
20. У доношеного новонародженого було виміряно відстань від надперенісся до потиличного горба - 12 см. Окружність голівки становить 34 см. Вкажіть розмір за яким проводилось вимірювання:
- A. Середній косий розмір
 - B. Прямий розмір
 - C. Малий косий розмір
 - D. Вертикальний розмір
 - E. Великий косий розмір
21. На якому етапі визначається стать майбутньої дитини:
- A. Бластоцисти
 - B. На 5-6 тижні вагітності
 - C. У момент запліднення
 - D. Зиготи
 - E. Морули
22. На якому етапі розвитку плодового яйця відбувається імплантація:
- A. Бластоцисти
 - B. Запліднення
 - C. Фатули
 - D. Зиготи
 - E. Морули

23. З якого терміну вагітності зародок називають плодом:
- A. 6 тижнів
 - B. 10 тижнів
 - C. 8 тижнів
 - D. 3 тижні
 - E. 4 тижні
24. Акушерка проводить огляд та пальпацію черепа новонародженого. Вкажіть між якими кістками розташоване велике тім'ячко.
- A. Однією потиличною і двома тім'яними
 - B. Двома лобовими і однією потиличною
 - C. Двома скроневими і двома тім'яними
 - D. Двома лобовими і двома тім'яними
 - E. Двома лобовими і двома скроневими
25. Де відбувається процес запліднення?
- A. В інтерстиціальній частині маткової труби.
 - B. В цервікальному каналі.
 - C. В ампулярній частині маткової труби.
 - D. В порожнині матки.
 - E. В істмічній частині маткової труби.
26. Вагітна 28 років з'явилася на черговий прийом в жіночу консультацію в терміні 34-35 тижнів. Під час пальпації живота за допомогою прийомів Леопольда акушерка запідозрила багатоводдя. Назвіть оболонку плідного яйця, яка виробляє навколоплідні води.
- A. Хоріон
 - B. Амніон
 - C. Децидуальна оболонка
 - D. Трофобласт
 - E. Мезенхіма
27. Роділля 25 років знаходиться в II періоді термінових пологів. Вкажіть, як називається зміна форми голівки плода при проходженні його через пологові шляхи.
- A. Родова пухлина
 - B. Кефалогематома
 - C. Конфігурація голівки
 - D. Біомеханізм пологів
 - E. Деформація голівки

28. В якій частині маткової труби, як правило, відбувається запліднення яйцеклітини?
- A. В ділянці між перешийком і ампулярною частиною
 - B. В ділянці труби зразу після виходу із матки
 - C. В перешийковій
 - D. В інтерстиціальній
 - E. В ампулярній
29. Який гормон виявляється в сечі тестом на вагітність?
- A. Прогестерон
 - B. Хоріонічний гонадотропін
 - C. Гестоген
 - D. Андроген
 - E. Фолікулін
30. Який з розмірів голівки плода є найбільшим?
- A. Середній косий розмір
 - B. Прямий розмір
 - C. Великий поперечний розмір
 - D. Великий косий розмір
 - E. Вертикальний розмір
31. Ви акушерка ЖК, проводите бесіду із вагітною про запобігання розвитку вроджених вад плода. На що слід наголосити в даній ситуації?
- A. відмова від куріння та вживання алкоголю
 - B. перебування на свіжому повітрі
 - C. догляд за молочними залозами
 - D. повноцінний сон, не менше 8 год.
 - E. заняття гігієнічною гімнастикою
32. При внутрішньому акушерському дослідженні роділлі виявлено: крижова западина цілком заповнена голівкою плода, пальпується тільки нижній край лона, сідничні горби і куприк. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі ближче до прямого. В якій площині малого тазу знаходиться голівка плода.
- A. Вузькій частині промежини малого тазу
 - B. Малім сегментом у вході в малий таз

- C. У виході з таза
- D. Широкої частині порожнини малого тазу
- E. Над входом в малий таз

33. Вагітна жінка 25-ти років звернулась в жіночу консультацію в терміні вагітності 7 місяців (28 тижнів) для планового обстеження. Положення плода поздовжнє, І позиція, передній вид. Визначте довжину плода за формулою Гаазе:

- A. 45 см
- B. 30 см
- C. 49 см
- D. 35 см
- E. 40 см

34. Роділлі 31 року під час проведення обстеження в першому періоді пологів встановлено, що голівка плода нерухома, більша частина її міститься над входом до тазу, невеликий сегмент голівки нижче від площини входу в таз. вказати положення голівки відносно площини тазу

- A. Голівка над входом до малого тазу
- B. Голівка у вході в малий таз великим сегментом
- C. Голівка в широкій частині порожнини малого тазу
- D. Голівка в вузькій частині порожнини тазу
- E. Голівка у вході малий таз малим сегментом

35. Роділля 20 років І період пологів.. Перейми слабкі. Голівка прижата до входу малого тазу. При піхвовому дослідженні встановлено асінклитичне вставлення голівки. Охарактеризувати дану особливість розташування голівки.

- A. Мале тім'ячко на однаковій відстані від мису та крижів
- B. Сагітальний шов на однаковій відстані від симфізу та крижів
- C. Сагітальний шов знаходиться ближче до симфізу або крижів
- D. Велике тім'ячко на однаковій відстані від мису та крижів
- E. До входу малого тазу звернена потилиця

36. Мінімальна маса доношеного плоду:

- A. 2400 гр
- B. 2700 гр
- C. 2800 гр
- D. 2300 гр
- E. 3000 гр

37. При внутрішньому дослідженні встановлено, що предлегла голівка спереду, ближче до лона пальпується мале тім'ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь конфігурації голівки:

- A. кульова
- B. II
- C. IV
- D. I
- E. III

38. Маса доношеної дитини досягає:

- A. понад 2500г
- B. до 3,000г
- C. понад 1,500г
- D. до 3,500г
- E. понад 2000г

Плід – об'єкт пологів. Відповіді:

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| 1) - A; | 11) - B; | 21) - C; | 31) - A; |
| 2) - E; | 12) - B; | 22) - A; | 32) - A; |
| 3) - D; | 13) - E; | 23) - C; | 33) - D; |
| 4) - A; | 14) - C; | 24) - D; | 34) - E; |
| 5) - A; | 15) - D; | 25) - C; | 35) - C; |
| 6) - E; | 16) - C; | 26) - B; | 36) - B; |
| 7) - D; | 17) - A; | 27) - C; | 37) - B; |
| 8) - A; | 18) - E; | 28) - E; | 38) – A. |
| 9) - A; | 19) - C; | 29) - B; | |
| 10) - B; | 20) - B; | 30) - D; | |