



Пологи. I період пологів

1. Вагітна 28-ми років звернулася в приймальне відділення пологового будинку. Строк вагітності 38-39 тижнів. Яка з перелічених ознак свідчить про початок пологів?

- A. притиснення передлеглої частини плода до входу в таз
- B. регулярні скорочення м'язів матки
- C. тупий біль у ділянці крижів
- D. виділення з піхви тягучого слизового секрету
- E. нерегулярний біль у нижній частині живота

2. Роділля 20 років, знаходиться в індивідуальному пологовому залі. При піхвовому обстеженні: шийка матки згладжена, розкриття її до 8 см., плодовий міхур цілий, передлегла частина голівка. Вкажіть який період пологів?

- A. Перший період пологів
- B. Третій період пологів
- C. Другий період пологів
- D. Ранній післяпологовий період
- E. Прелімінарний період

3. Вагітна 23 роки в терміні 40 тижнів, перейми по 20-30 секунд через 4-5хвилин, передлегла частина малим сегментом в порожнині малого тазу, серцебиття плода 140/хв. Під час однієї з переймів відішли світлі навколоплідні води. Яка тактика акушерки в даному випадку?

- A. Виміряти висоту стояння дна матки
- B. Стежити за динамікою переймів
- C. Підготуватися до стимуляції пологової діяльності
- D. Провести зовнішнє акушерське обстеження
- E. Провести вагінальне дослідження

4. Акушерка при аналізуванні партограми визначає, що час відкриття шийки матки у повторнонароджуючої швидше в порівнянні з першовагітної. Яким механізмом відкриття шийки матки у першовагітної це обумовлено?

- A. В залежності від медикаментозного забезпечення
- B. Спочатку шийка матки згладжується, потім розкривається внутрішній зів, слідом зовнішній
- C. В кожному випадку по різному
- D. Спочатку розкривається зовнішній, слідом внутрішній зів,
- E. Згладжування та розкриття відбувається одночасно

5. У першовагітної 24 років з початку регулярних переймів минуло 4 години, АТ 120/80, положення плода повздовжнє, головне передлежання, серцебиття 130/хв. При піхвовому дослідженні шийка матки скорочена до 1,5 см, відкриття 2 см. Плідний міхур цілий, напружений. Голівка плоду притиснута до входу в малий таз. У якому періоді пологів знаходиться роділля?

- A. Фізіологічний прелімінарний період
- B. I період активна фаза
- C. Передвісники пологів
- D. Патологічний прелімінарний період
- E. I період латентна фаза

6. Роділля 25 років. Вагітність перша, 40 тижнів. Жінка перебуває у пологовому залі. Яким чином медсестра повинна спостерігати за розвитком переймів у роділлі?

- A. Покласти руку на дно матки
- B. Підрахувати частоту дихання у роділлі
- C. Виміряти пульс у роділлі
- D. Проводити аускультацию серцебиття плода
- E. Виміряти артеріальний тиск у роділлі

7. Скільки існує критеріїв оцінювання ступеня зрілості шийки матки за шкалою Бішопа:

- A. 3
- B. 7
- C. 4
- D. 5
- E. 6

8. Початком I-го періоду пологів слід вважати:

- A. Повне розкриття шийки матки
- B. Розкриття шийки матки до 8 см
- C. Розкриття шийки матки до 3 см
- D. Початок регулярної пологової діяльності
- E. Вилиття навколоплідних вод

9. Скільки ступенів зрілості шийки матки виділяють за шкалою Бішопа:

- A. 1
- B. 4
- C. 2
- D. 3
- E. 5

10. Визначте початок першого періоду пологів.

- A. Регулярні перейми.
- B. Повне розкриття шийки матки.
- C. Розкриття шийки матки на 6 см.
- D. Відходження навколоплідних вод.
- E. Нерегулярні перейми.

11. Що відбувається в першому періоді пологів?

- A. Розкриття шийки матки.
- B. Зганяння плода.
- C. Відшарування плаценти.
- D. Відшарування і народження плаценти.
- E. Народження плаценти.

12. Роділля 21 років поступила в пологове відділення у I періоді пологів. Вкажіть один із сучасних принципів ведення пологів відповідно до новітніх перинатальних технологій.

- A. Знеболювання пологів
- B. Контроль за станом роділлі
- C. Повна санітарна обробка роділлі
- D. Контроль за станом плода
- E. Партнерські пологи

13. Роділля К., 40 тижнів вагітності, поступила у пологове відділення зі скаргами на відходження навколоплідних вод при розкритті шийки матки на 4 см. Про яке відходження вод йде мова?

- A. Попереднє
- B. Раннє
- C. Пізнє
- D. Передчасне
- E. Вчасне

14. Яка нормальна тривалість пологів у роділлі, яка народжує вперше?
- A. Від 6 до 18 годин
 - B. Більше 24 годин
 - C. До 5 годин
 - D. 4-6 годин
 - E. 2-3 години
15. У відділення патології поступила вагітна для підготовки до пологів, строк вагітності 39 тижнів. Виберіть, яка ознака відноситься до провісників пологів:
- A. Виділення слизового секрету із шийки матки
 - B. Підвищення АТ
 - C. Набряки
 - D. Блювання
 - E. Кровотеча
16. Коли відбувається вчасне вилиття навколоплодових вод?
- A. при розкритті шийки матки на 4-5 см
 - B. до появи регулярної пологової діяльності
 - C. при повному чи майже повному розкритті шийки матки
 - D. плідний міхур виконав свою функцію і стає перешкодою
 - E. під час регулярної пологової діяльності
17. Яка акушерська тактика при відходженні навколоплодових вод у першому періоді пологів?
- A. провести катетеризацію сечового міхура
 - B. змінити підкладну пелюшку
 - C. перевести роділлю у пологовий зал
 - D. провести внутрішнє акушерське дослідження
 - E. провести зовнішнє акушерське дослідження
18. Ви працюєте акушеркою. Вам потрібно накрити у пологовій залі стерильний стіл після обробки його методом:
- A. дворазового протирання відповідним дезінфекційним розчином
 - B. одноразового протирання 2% розчином натрію гідрокарбонату
 - C. кварцування протягом 30 хв.
 - D. одноразового протирання 3% розчином перексиду водню;
 - E. дворазового протирання мийним розчином

19. У першовагітної в терміні вагітності 38-ми тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?

- A. Передвісники пологів
- B. Загроза передчасних пологів
- C. Третій період
- D. Другий період
- E. Перший період

20. В пологову палату поступила впершенароджуюча 26-ти років. Вкажіть нормальну тривалість латентної фази першого періоду пологів:

- A. 30 хвилин
- B. 5-6 годин
- C. До 2 годин
- D. Не більше 8 годин
- E. 1-2 години

21. Роділля 24 років поступила в пологове відділення в кінці першого періоду пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A. Народження посліду
- B. Відкриття шийки матки на 2 см
- C. Народження плоду
- D. Повне відкриття шийки матки
- E. Періодичний ниючий біль

22. В пологовий будинок поступила вагітна в терміні вагітності 40 тижнів зі скаргами на тягнучий біль в попереку і регулярні болючі перейми. Які методи знеболювання пологів може застосувати акушерка?

- A. Застосувати методи дії на рефлексогенні зони
- B. Застосувати інгаляцію закису азоту
- C. Застосувати анальгетики
- D. Застосувати спазмолітики
- E. Застосувати гіпотензивні засоби

23. У роділлі, при піхвовому обстеженні, шийка матки згладжена, розкриття 6 см, плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці плоду. Вкажіть період пологів:
- A. II період пологів
 - B. Післяпологовий період
 - C. Провісники пологів
 - D. I період пологів
 - E. III період пологів
24. В якій послідовності відбувається розкриття шийки матки у першонароджуючої:
- A. Згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка
 - B. Згладжування шийки матки, розкриття внутрішнього вічка, розкриття зовнішнього вічка
 - C. Зовнішнє вічко розкривається одночасно з внутрішнім
 - D. Розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки, розкриття зовнішнього вічка
 - E. Розкриття зовнішнього вічка, розкриття внутрішнього вічка, згладжування шийки матки
25. Скільки періодів пологів розрізняють:
- A. Один
 - B. П'ять
 - C. Три
 - D. Чотири
 - E. Два
26. У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?
- A. Загроза передчасних пологів
 - B. Перший період
 - C. Передвісники пологів
 - D. Другий період
 - E. Третій період

27. Перший період пологів називається:

- A. Послідовий період
- B. Період згинання
- C. Період розкриття
- D. Ранній період
- E. Прелімінарний період

28. Як називають жінку яка народжує?

- A. Мати
- B. Роділля
- C. Хвора
- D. Породілля
- E. Вагітна

29. Пологи - другі. Вилиття навколоплідних вод - дві години потому, відкриття шийки матки 7-8 см. Визначте період пологів:

- A. Післяродовий період
- B. Період розкриття шийки матки
- C. Латентний період
- D. Період зганяння
- E. Ранній період

30. Коли у нормі виливаються навколоплідні води?

- A. При повному розкритті шийки матки
- B. У I періоді пологів
- C. У II періоді пологів
- D. У III періоді пологів
- E. До пологів

31. У пологовий будинок госпіталізовано вагітну. Що свідчить про початок у неї пологів?

- A. Головний біль
- B. Регулярні перейми
- C. Вилиття навколоплідних вод
- D. Опущення дна матки
- E. Відходження слизової пробки

32. Роділля поступає в пологовий стаціонар. Який документ повинна оформити акушерка в приймальному відділенні?
- A. Індивідуальна карта вагітної
 - B. Обмінна карта вагітної
 - C. Історія пологів
 - D. Медична карта стаціонарного хворого
 - E. Карта диспансерного спостереження
33. Як документально відображає акушерка перебіг та ведення пологів?
- A. Графічно на партограмі
 - B. Письмово в історії пологів
 - C. У вигляді стовпчиків на температурному листі
 - D. Письмово в тестах рухів плода
 - E. Графічно на гравідограмі
34. Акушерка ЖК проводить заняття з безпечного материнства та батьківства та інформує слухачів про періоди пологів. Перечисліть їх назви:
- A. Прелімінарний, розкриття, послідовий
 - B. Провісники, розкриття, зганяння
 - C. Розкриття, зганяння, післяпологовий
 - D. Розкриття, зганяння, послідовий
 - E. Прелімінарний, зганяння, послідовий
35. Вагітна 26 років звернулась до акушерки пологового будинку зі скаргами на ниючі болі в ділянці крижів, нерегулярні, короткочасні скорочення матки. Вагітність перша 37-38 тижнів. Дані піхвового дослідження : шийка матки до 2 см відхилена до заду, зовнішнє вічко закрите. Ваш попередній діагноз:
- A. Вагітність I, 37-38 тиж., провісники пологів
 - B. Вагітність I, 37-38 тиж.
 - C. Вагітність I, 37-38 тиж., пологи I, I період, латентна фаза
 - D. Вагітність I, 37-38 тиж., пологи I, II період пологів
 - E. Вагітність I, 37-38 тиж., пологи I, I період, активна фаза

36. Повторновагітна 30 років з доношеною вагітністю жаліється на відходження навколоплідних вод. Пологової діяльності немає. Голова плода притиснута до входу в малий таз. Серцеві тони ясні, ритмічні - 132 уд/хв. Яке дослідження слід виконати для складання плану ведення пологів:

- A. Провести зовнішнє акушерське дослідження
- B. Виміряти висоту стояння дна матки
- C. Виміряти обвід променево-зап'ясткового суглоба
- D. Провести піхвове дослідження
- E. Виміряти окружність живота

37. Першовагітна 21 року госпіталізована в пологовий будинок з активною родовою діяльністю, що почалась 4 години тому. Перейми по 30-35 секунд через 5-7 хвилин, середньої сили. Піхвове дослідження: шийка матки згладжена, вкорочена до 1 см, розкриття до 5 см. Ваш попередній діагноз:

- A. Вагітність I, пологи I, I період, активна фаза
- B. Вагітність I, пологи I, I період, латентна фаза
- C. Вагітність I, 37-38 тиж.
- D. Вагітність I, провісники пологів
- E. Вагітність I, 37-38 тиж., пологи I, I період пологів

38. Повторнородяча перший період пологів триває 6 годин. Через 15 хвилин після піхвового дослідження злились прозорі навколоплідні води у помірній кількості. Ваші першочергові дії:

- A. Провести піхвове дослідження
- B. Провести аускультацию серцебиття плода
- C. Провести пальпацію живота 1 та 2 прийомами
- D. Провести пальпацію живота роділлі 3 та 4 прийомами
- E. Провести профілактику дистресу плода

39. При внутрішньому дослідженні встановлено, що предлегла голівка спереду, ближче до лона палькується мале тім'ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь конфігурації голівки:

- A. II
- B. I
- C. III
- D. Нульова
- E. IV

40. При внутрішньому акушерському дослідженні встановлено, що нижній полюс голівки знаходиться на рівні інтерспінальної лінії. Яка ступінь встановлення голівки:

- A. В порожнині таза
- B. Малим сегментом у входу в малий таз
- C. Великим сегментом у входу в малий таз
- D. Голівка в вузькій частині
- E. Голівка в площині виходу

41. Роділля 25 років поступила в акушерську клініку з активною пологовою діяльністю. Який із перерахованих методів інструментального дослідження застосовується під час вагітності та в пологах?

- A. Зондування матки
- B. Біопсія
- C. Огляд шийки матки за допомогою дзеркал
- D. Проба з кульковими щипцями
- E. Гістерографія

42. Акушерка заповнює партограму у першому періоді пологів. Які основні компоненти партограми?

- A. Стан плоду, стан жінки, протікання пологів
- B. Протікання пологів, серцебиття плоду
- C. Стан роділлі, серцебиття плоду
- D. Температура, пульс, АТ роділлі
- E. Скорочення матки, серцебиття плоду

43. Роділля 19 років поступила в пологове відділення через 2 години після появи регулярних перейм. Вкажіть апаратний метод реєстрації скорочень матки.

- A. Фетоскопія
- B. Амніоцентез
- C. Токографія
- D. Амніоскопія
- E. Кордоцентез

44. Акушерка проводить аускультацию плода. Яка частота серцебиття плода при задовільному стані під час пологів?

- A. 100-180 уд\хв
- B. 140-160 уд/хв
- C. 110-180 уд\хв
- D. 120-130 уд/хв
- E. 120-140 уд/хв

Пологи. I період пологів. Відповіді:

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1) - B; | 11) - A; | 21) - D; | 31) - B; | 41) - C; |
| 2) - A; | 12) - E; | 22) - A; | 32) - C; | 42) - A; |
| 3) - E; | 13) - B; | 23) - D; | 33) - A; | 43) - C; |
| 4) - B; | 14) - A; | 24) - D; | 34) - D; | 44) - C. |
| 5) - E; | 15) - A; | 25) - C; | 35) - A; | |
| 6) - A; | 16) - C; | 26) - B; | 36) - D; | |
| 7) - D; | 17) - D; | 27) - C; | 37) - A; | |
| 8) - D; | 18) - A; | 28) - B; | 38) - A; | |
| 9) - D; | 19) - E; | 29) - B; | 39) - A; | |
| 10) - A; | 20) - D; | 30) - A; | 40) - C; | |