



Пологи. II період пологів

1. Через 5 годин від початку пологової діяльності при піхвовому дослідженні визначається: відкриття шийки матки до 3 см, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі входу в малий таз, мале тім'ячко зліва, збоку. Про який момент біомеханізму пологів йде мова?

- A. V момент - додаткове згинання голівки
- B. II момент - внутрішній поворот голівки
- C. I момент - згинання голівки
- D. IV момент - внутрішній поворот плечиків
- E. III момент - розгинання голівки

2. Першовагітна 28 років. Другий період пологів, акушерка надає допомогу. Що повинна зробити акушерка після утворення точки фіксації між підпотиличною ямкою та нижнім краєм симфізу?

- A. Допомогти звороту тулуба
- B. Заборонити роділля натужуватися
- C. Попередити розгинання голівки
- D. Провести запозичення тканин промежини
- E. Захищати промежину

3. Роділля 20 років, перші пологи своєчасні. При внутрішньому акушерському дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття маткового вічка повне, плідний міхур відсутній, передлежить голівка плода, великим сегментом у площині входу в малий таз. Мале тім'ячко зліва ближче до симфізу, стріловидний шов в правому косому розмірі. Вказати який момент біомеханізму відбувається?

- A. Згинання голівки
- B. Розгинання голівки
- C. Внутрішній зворот голівки
- D. Додаткове вгинання голівки
- E. Внутрішній зворот тулуба

4. Голівка плода має доліхоцефалічну форму, в потиличній ділянці визначається пологова пухлина, розташована між великим та малим тім'ячком. Який біомеханізм пологів відбувається в даному випадку?

- A. Лобне передлежання
- B. Передній вид потиличного передлежання
- C. Задній вид потиличного передлежання
- D. Передньоголовне передлежання
- E. Лицьове передлежання

5. При задньому виді потиличного передлежання точка фіксації:

- A. Межа волосистої частини потилиці
- B. Верхня щелепа
- C. Перенісся
- D. Підпотилична ямка
- E. Межа волосистої частини лоба

6. При внутрішньому акушерському дослідженні роділлі виявлено: крижова западина цілком заповнена голівкою плода, пальпується тільки нижній край лона, сідничні горби і куприк. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі ближче до прямого. В якій площині малого тазу знаходиться голівка плода.

- A. Над входом в малий таз
- B. Малим сегментом у вході в малий таз
- C. У виході з таза
- D. Вузькій частині промежини малого тазу
- E. Широкій частині порожнини малого тазу

7. Пологова діяльність 6 годин. При піхвовому дослідженні визначається: відкриття шийки матки до 3 см, передлежить голівка притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов в поперечному розмірі тазу, мале тім'ячко зліва, збоку. Про який момент біомеханізму пологів йде мова:

- A. Додаткове згинання голівки
- B. Розгинання голівки
- C. Внутрішній поворот плечиків
- D. Згинання голівки
- E. Внутрішній поворот голівки

8. Тривалість другого періоду пологів становить:

- A. 1-2 години
- B. Більше 2 годин
- C. До 1 години
- D. 30-45 хвилин
- E. 15-20 хвилин

9. Акушерка-практикантка разом з лікарем веде II період пологів. З метою контролю стану плода, як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плода?

- A. В паузах після кожної потуги
- B. Через кожних 5 хв.
- C. Через кожних 15 хв.
- D. Під час кожної потуги
- E. Під час прорізування голівки

10. Роділлі 31 року під час проведення обстеження в першому періоді пологів встановлено, що голівка плода нерухома, більша частина її міститься над входом до тазу, невеликий сегмент голівки нижче від площини входу в таз. вказати положення голівки відносно площини тазу

- A. Голівка у вході в малий таз великим сегментом
- B. Голівка у вході малий таз малим сегментом
- C. Голівка в вузькій частині порожнини тазу
- D. Голівка над входом до малого тазу
- E. Голівка в широкій частині порожнини малого тазу

11. У роділлі 20 років з'явилися потуги. З якого моменту необхідно надавати акушерську допомогу при головному передлежанні плода?

- A. З моменту врізування голівки плода.
- B. З моменту розгинання голівки плода.
- C. З моменту прорізування голівки плода.
- D. З моменту повного розкриття шийки матки.
- E. З моменту народження голівки плода

12. У роділлі при внутрішньому акушерському дослідженні визначили повне розкриття шийки матки. Вкажіть на скільки сантиметрів розкриття шийки матки вважається повним:

- A. 6-7 см
- B. 15-16 см
- C. 10-12 см
- D. 13-14 см
- E. 8-9 см

13. Скільки кроків теплового ланцюжка ви знаєте:

- A. 10
- B. 9
- C. 5
- D. 11
- E. 15

14. Ви акушерка пологового залу. Що ви проведете після народження дитини з метою дотримання правил "теплового ланцюжка"?

- A. ретельно видалите залишки пологової змазки
- B. туге сповивання
- C. купання новонародженого
- D. негайне обсушування дитини
- E. антропометрію новонародженого

15. Ви акушерка, приймаєте пологи в терміні 39-40 тиж. Яка оптимальна температура навколишнього середовища повинна бути в пологовому залі?

- A. 18°C
- B. 28°C
- C. 20°C
- D. 23°C
- E. 25°C

16. Роділля 19 років народила живу доношену дівчинку. Визначте інтервал часу, який необхідний для здійснення контакту "шкіра до шкіри" з метою колонізації новонародженого материнською мікрофлорою.

- A. 15 хвилин
- B. 2 години
- C. 5 хвилин
- D. 1 годину
- E. 30 хвилин

17. Назвіть третій момент біомеханізму пологів при передньому виді потиличного передлежання:

- A. Згинання голівки
- B. Внутрішній поворот голівки потилицею до лона
- C. Внутрішній поворот голівки потилицею до крижів
- D. Додаткове згинання
- E. Розгинання голівки

18. При передньому виді потиличного передлежання голівка прорізується:

- A. Вертикальним косим розрізом
- B. Середнім косим розрізом
- C. Великим косим розміром
- D. Прямим косим розрізом
- E. Малим косим розміром

19. Що являється провідною точкою при передньому виді потиличного передлежання:

- A. Середина сагітального шва
- B. Середина лобного шва
- C. Підборіддя
- D. Велике тім'ячко
- E. Мале тім'ячко

20. II період I пологів: при бімануальному дослідженні шийка матки розкрита повністю, навколоплодовий міхур відсутній, передлежить голівка, що повністю заповнює крижову западину, сідничні ості не визначаються. При потугах промежина випинається. Визначте знаходження голівки:

- A. Великим сегментом площині входу
- B. Малим сегментом площині входу
- C. В площині виходу малого тазу
- D. В площині вузької частини малого тазу
- E. В площині широкої частини малого тазу

21. Визначте період пологів: повне відкриття маткового вічка, поява потуг:
- A. Період зганяння плода
 - B. Послідовий
 - C. Період розкриття маткового вічка
 - D. Післяпологовий
 - E. Прелемінарний
22. Роділля в другому періоді родів. Зовнішніми прийомами голівка не визначається. Акушерка використала прийом Піскачека, вказівний палець наштовхнувся на голівку. Ваш висновок:
- A. Голівка плода великим сегментом у вході в малий таз
 - B. Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз
 - C. Голівка плода у вузькій частині малого тазу
 - D. Голівка плода над входом у малий таз
 - E. Голівка плода в широкій частині порожнини малого тазу
23. Другий період пологів в головному передлежанні. Народилась потилиця. Першочергові дії акушерки:
- A. Припинити потуги, звільнити тім'яні горби, захопити рукою голівку
 - B. Припинити потугу, здійснювати запозичення тканин
 - C. Запобігати передчасному розгинанню голівки
 - D. Запропонувати роділлі потужитися
 - E. Запропонувати роділлі дихати відкритим ротом
24. Вагітна 20 років. При вагінальному дослідженні відкриття шийки матки повне, предлегла частина, голівка знаходиться в площині виходу з малого тазу. Стрілоподібний шов в прямому розмірі таза, мале тім'ячко під симфізом. Який момент біомеханізму голівки:
- A. Внутрішній поворот
 - B. Згинання голівки
 - C. Опускання голівки
 - D. Внутрішній поворот плечиків
 - E. Розгинання голівки

25. Коли доцільно прикласти новонародженого до грудей після фізіологічних пологів?
- A. У першу добу після пологів.
 - B. Одразу після початку лактації.
 - C. Через 12 годин після пологів.
 - D. Одразу після пологів.
 - E. У перші 2 години після пологів.
26. Коли у нормі виливаються навколоплідні води?
- A. При повному розкритті шийки матки.
 - B. У III періоді пологів.
 - C. До пологів.
 - D. У I періоді пологів.
 - E. У II періоді пологів.
27. При внутрішньому акушерському дослідженні встановлено, що нижній полюс голівки знаходиться на рівні інтерспінальної лінії. Яка ступінь встановлення голівки:
- A. голівка в площині виходу
 - B. великим сегментом у входу в малий таз
 - C. в порожнині таза
 - D. малим сегментом у входу в малий таз
 - E. голівка в вузькій частині
28. При внутрішньому дослідженні встановлено, що предлегла голівка спереду, ближче до лона палькується мале тім'ячко, стрілоподібний шов в правому косому розмірі, кістки черепа помірно заходять одна за одну. Яка ступінь конфігурації голівки:
- A. I
 - B. нульова
 - C. II
 - D. III
 - E. IV

29. Роділля 23 років вагітність друга I період пологів. При піхвовому дослідженні встановлено: відкриття маточного вічка 9 см, плодового міхура немає, мале тім'ячко праворуч, розташовано ближче до симфізу. Який біомеханізм пологів відбувається?

- A. Задній вид потиличного передлежання
- B. Передній вид потиличного передлежання
- C. Передньоголовне передлежання
- D. Лобне передлежання
- E. Лицьове передлежання

Пологи. II період пологів. Відповіді:

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1) - C; | 11) - C; | 21) - A; |
| 2) - B; | 12) - C; | 22) - C; |
| 3) - C; | 13) - A; | 23) - A; |
| 4) - C; | 14) - D; | 24) - E; |
| 5) - E; | 15) - E; | 25) - D; |
| 6) - D; | 16) - B; | 26) - A; |
| 7) - D; | 17) - E; | 27) - B; |
| 8) - A; | 18) - E; | 28) - C; |
| 9) - A; | 19) - E; | 29) - B. |
| 10) - B; | 20) - C; | |