



## Аномалії розвитку плодового яйця

1. Пацієнтка Н. 25 років знаходиться на диспансерному нагляді після міхурового занеску. На профілактику і своєчасне виявлення якого захворювання спрямовані дії медичного персоналу?

- A. Фіброміома матки
- B. Хоріонепітеліома
- C. Ендо метріоз
- D. Саркома
- E. Ендо метрит

2. В ранньому післяпологовому періоді акушерка оглянула пуповину і встановила що вона надмірно довга. Вкажіть довжину пуповини.

- A. Більше 40 - 50 см
- B. Більше 120 - 130 см
- C. Більше 50 - 60 см
- D. Більше 70 - 80 см
- E. Більше 100 см

3. Вагітна скаржиться на ядуху, різке збільшення живота. Строк вагітності 29 тижнів. Обвід живота-120 см. Висота стояння дна матки-38 см. Матка напружена, частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе, 140 пошт.\хв. Про яке ускладнення йде мова?

- A. Багатоводдя
- B. Гестоз вагітних
- C. Багатопліддя
- D. Міхуровий занесок
- E. Аномалії розвитку плода

4. Що являється найбільш частою причиною макросомії:

- A. Цукровий діабет I тип
- B. Підлітковий вік першонароджуючої
- C. Спадкові хвороби
- D. Переношування вагітності
- E. Ожиріння

5. Повторновагітна у терміні 36 тижнів скаржиться на неприємні відчуття у животі та попереку задишку, серцебиття. Ці симптоми з'явилися 4-5 ТИЖНІВ тому і поступово посилюються. При об'єктивному обстеженні дно матки під мечеподібним відростком, ОЖ 120см, матка при пальпації напружена, визначається флуктуація. Положення плода нестійке, серцебиття прослухати важко. Ваш попередній діагноз.

- A. Багатоплідна вагітність.
- B. Хронічне багатоводдя
- C. Хоріонепітеліома
- D. Міхуровий занесок
- E. Гостре багатоводдя

6. У 25-ти річної жінки, в анамнезі три самовільних викидня (термін 4-5 тижнів вагітності). На яке обстеження акушерці необхідно оформити скерування?

- A. Імунологічне
- B. Рентгеноскопічне
- C. Кольпоцитологічне
- D. Медико-генетичне
- E. Кульдоскопічне

7. При черговому огляді вагітної акушерка виявила, що матка НЕ ВІДПОВІДАЄ ТЕРМІНУ ВАГІТНОСТІ, щільноеластичної консистенції. Пацієнтка скаржиться на значні кров'яністі виділення. Про яку патологію можна подумати?

- A. Передчасні пологи
- B. Аборт самовільний
- C. Аборт штучний
- D. Міхуровий занесок
- E. Завмерла вагітність

8. Жінка 32 роки, поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на кров'янисті виділення, нудоту, блювання. Остання менструація - 3 місяці тому. Вагінально: матка збільшена до 16 тижневої вагітності, м'яка, вічко закрите, шийка матки без особливостей. Передбачуваний діагноз - міхуровий занесок. Яке дослідження найбільш інформативне для підтвердження діагнозу?

- A. Кольпоцитологічне дослідження
- B. Рентгенологічне дослідження органів малого таза
- C. Ультразвукове дослідження
- D. Аналіз крові на прогестерон
- E. Аналіз сечі на хоріонічний гонадотропін

9. В пологах роділля 25 років. Перші пологи, води цілі, ОЖ-112, ВДМ-38, матка напружена, наявна флюктуація, плід рухомий. С/б приглушене, шийка розкрита на 4 см, плодовий міхур напружений, передлегла частина рухома, невеликих розмірів. Які особливості ведення пологів в такому випадку?

- A. Стимуляція пологової діяльності
- B. Медикаментозний сон до відходження вод
- C. Амніотомія, подальша стимуляція пологової діяльності, закінчення пологів через природні шляхи
- D. Амніотомія з подальшою екстракцією плода за тазовий кінець
- E. Кесарів розтин

10. Ви акушерка ЖК, проводите бесіду із вагітною про запобігання розвитку вроджених вад плода. На що слід наголосити в даній ситуації?

- A. догляд за молочними залозами
- B. відмова від куріння та вживання алкоголю
- C. перебування на свіжому повітрі
- D. заняття гігієнічною гімнастикою
- E. повноцінний сон, не менше 8 год.

11. Повторновагітна у терміні 36 тижнів скаржиться на неприємні відчуття у животі та попереку задишку, серцебиття. Ці симптоми з'явилися 3-4 ДНІ тому і поступово посилюються. При об'єктивному обстеженні дно матки під мечеподібним відростком, ОЖ - 120 см, матка при пальпації напружена, тугоеластичної консистенції, визначається флюктуація. Положення плода нестійке, серцебиття прослухати важко, приглушене. Ваш попередній діагноз:

- A. Гостре багатоводдя
- B. Міхурцевий занесок
- C. Багатоплідна вагітність
- D. Хоріонепітеліома
- E. Хронічне багатоводдя

12. До гінекологічного відділення доставлена жінка Ц., 28 років, з кровотечею, якій був поставлен діагноз "міхуровий занесок". Визначте першочергові дії невідкладної допомоги:

- A. Призначення кровоспинних препаратів
- B. Оперативне лікування
- C. Видалення міхурового залишку із матки
- D. Призначення кровозамінників
- E. Призначення антибіотиків

13. На ФАП звернулася вагітна в 11 тиж. вагітності. Є підозра на міхуровий занесок. У неї з'явились кров'яністі виділення з пухирцями, матка більша від строку вагітності, щільно еластичної консистенції. Для постановки діагнозу "міхуровий занесок", яка ознака є вирішальною?

- A. Розміри матки більші від терміну вагітності
- B. Значне підвищення хіріогоніну в сечі
- C. Матка щільно еластичної констистенції
- D. "Снігові бурі" в матці при УЗО
- E. Кров'яністі виділення з блідо-жовтуватими пухирцями

14. Повторновагітна 38 років, дана вагітність 5, на обліку не перебувала, звернулася до акушерки ФАПу зі скаргами на задишку, набряки на гомілках. Об'єктивно: дно матки розміщено високо, під мечеподібним відростком, ОЖ - 118 см. Над входом в малий таз палькується голівка невеликих розмірів, в дні матки пальпуються округла правильної форми балотуюча частина, та частина плода м'якуватої консистенції неправильної форми. Праворуч та ліворуч в різних відділах живота промацується дрібні частини плода. Серцебиття виразно вислуховується справа і зліва від пупка. Ваш попередній діагноз:

- A. Багатоплідна вагітність. Трійня
- B. Багатоплідна вагітність. Двійня
- C. Вагітність п'ята. Багатоводдя
- D. Міхуровий занесок
- E. Багатоплідна вагітність. Тазове передлежання першого плода

### **Аномалії розвитку плодового яйця. Відповіді:**

- |         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 1) - B; | 6) - D;  | 11) - A; |
| 2) - D; | 7) - D;  | 12) - C; |
| 3) - A; | 8) - C;  | 13) - E; |
| 4) - A; | 9) - C;  | 14) - B. |
| 5) - B; | 10) - B; |          |